

CANNA COCO

CANNA COCO est une ligne complète d'engrais et de substrats conçus spécialement pour la culture des plantes sur fibre de coco. CANNA COCO est le premier engrais formulé pour la culture sur fibre de coco. C'est le substrat le plus utilisé, tant par les cultivateurs professionnels que par les amateurs.

La gamme CANNA COGr vient compléter la gamme COCO standard. Parfaitement adaptée pour répondre aux attentes de tout cultivateur professionnel, elle comprend les pains COGr spéciaux.





CROISSANCE

PHASE VÉGÉTATIVE

	Durée de culture en semaines	Lumière/jour en heures	COCO ml A/ 10 Litres ml B/ 10 Litres entre	RHIZOTONIC ml/ 10 Litres	CANNAZYM ml/ 10 Litres entre	CANNABOOST ml/ 10 Litres entre	PK 13/14 ml/ 10 Litres	EC + en mS/cm entre	EC Total en mS/cm entre
Début / formation des racines (3-5 jours) Humidifier le substrat	<1	18	15 - 25	40	-	-	-	0,7 - 1,1	1,1 - 1,5
Phase végétative I - La plante se développe en volume	0-3 ¹	18	20 - 30	20	25	-	-	0,9 - 1,3	1,3 - 1,7
Phase végétative II - Jusqu'à la stagnation de la croissance avant formation de fruits ou de fleurs	2 - 4 ²	12	25 - 35	20	25	20 ⁵	-	1,1 - 1,5	1,5 - 1,9

FLORAISON

PHASE GÉNÉRATIVE

Phase générative I - Fleurs ou fruits se développent en longueur. Arrêt de la croissance en hauteur	2 - 3	12	30-40	5	25	20-40	-	1,4-1,8	1,8-2,2
Phase générative II - Fleurs ou fruits se développent en volume (largeur)	1	12	30-40	5	25	20-40	15	1,6-2,0	2,0-2,4
Phase générative III - Fleurs ou fruits se développent en masse	2 - 3	12	20-30	5	25	20-40	-	1,0-1,4	1,4 - 1,8
Phase générative IV - Processus de mûrissement des fleurs ou des fruits	1 - 2	10-12 ³	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0,0	0,4

- Cette période diffère selon la variété et le nombre de plants par m². Les plantes mères passent leur existence dans cette phase (6-12 mois).
- Le transfert de 18 à 12 heures est vécu différemment selon la variété. En général, ce transfert est à 2 semaines.
- Diminuer le nombre d'heures de lumière si le mûrissement se déroule trop vite. Surveillez l'augmentation de l'humidité relative de l'air.
- Doublez le dosage CANNAZYM à 50 ml/10 litres, si le substrat est réutilisé.
- En moyenne 20 ml/10L. En fonction des conditions de culture, le dosage peut être augmenté au maximum à 40 ml/10L.

EC: EC+ est une valeur basée en mS/cm pour une EC de l'eau = 0,0 à une température 25°C, pH 6,0, EC de l'eau de robinet utilisée, nous conseillons de l'ajouter au calcul de l'EC! Nous conseillons de tenir compte et de rajouter la mesure EC relevée dans l'eau du robinet, à celle conseillée. La mesure "EC total" dans l'exemple prend en compte une EC de 0,4 mS/cm dans l'eau du robinet.

pH: Valeur pH conseillée entre 5,5 et 6,2. L'ajout de pH moins peut augmenter l'EC. Utiliser toujours pH moins croissance pendant la période végétative et la période générative.

Les lignes directives du tableau ne sont pas applicables de façon stricte. Cependant, elles peuvent aider le cultivateur débutant pour le développement judicieux d'une stratégie optimale. La stratégie optimale est ensuite déterminée par des facteurs tels que: la température, l'humidité relative, le type de variété cultivée, le volume des racines, le pourcentage d'humidité dans le substrat, techniques d'arrosage etc.

Etablissez votre schéma de nutrition personnalisé sur www.canna.fr

CANNA
The solution for growth and bloom